



Fremme kvalitetssikring & bekvemmelighed vha app



2) Overekstremitet: Albue, underarm, hånd

Undersøgelse	Indikation	Projektion
UXRF25 Albue (articulatio cubiti)	Alt Hvis albuen ikke kan strækkes	1. AP 2. LAT Alternativ AP: Projektioner med Antebrachium på pladen og Humerus på pladen Supplement til traume: Ved negativ fund: 3. AP skrå til begge sider ved pt > 10 år. Hvis ikke skrå opt. så: 4. Albue 45°
UXRF30 Antebrachium	Alt	1. AP 2. Antebrachium LAT
UXRF40 Håndled (articulatio radiocarpea)	Alt	1. PA 2. LAT
UXRF40 Håndled Stress-optagelser	Special lægelig indikation	1. PA neutral 2. PA max. Ulnadeviation 3. PA max. Radial deviation 4. LAT neutral 5. LAT max. volar fleksjon 6. LAT max. dorsal extension
UXRF45 Os scaphoideum	Obs. Fraktur Efterfølgende kontrol	1. PA af håndled 2. LAT af håndled 3. Scaphoideum - specialoptagelser Scaphoideum - specialoptagelser
UXRF45 Carpal tunnel	Speciallægelig indikation	Carpal tunnel

Indikation

Alt


Undersøgelsesteknik



Patient position/lejring	Siddende med front eller aktuelle side mod lejet.
Område/indblanding	Lejet hæves til skulder højde Håndledet i neutralstilling med håndfladen mod pladen, hvor radius længdeakse forstættet ud mellem 2. og 3. finger. 90 grader fleksjon i albuen. Hvis muligt skal albuen herved være i højde med skulderen.
Kvalitetskriterier	Gårbue 1 og 3 skal fremstilles. (se tegning nedenfor) Hele carpus og distale 10 cm af underarmen fremstilles.
Centrering	I håndledet midt mellem processus styloideus radii og ulna
Kipning	0 °
FFA	1,1 meter




OUH, Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus

Kvalitetsorganisation		Tværgående dokumenter		Patientforløb		Håndbøger	
Interne medicinske specialer							
Endokrinologi	Gastroenterol. og hepatol.	Geriatric	Hæmatologi	Infektionsmedicin			
Kardiologi	Lungemedicin	Neurologi	Reumatologi				
Øvrige medicinske specialer							
Arbejds- og miljømedicin	Dermato-venereologi	Neurologi	Oncologi	Pædiatri			
Kirurgiske specialer							
Gynækologi og obstetrik	Karkeirurgi	Kirurgi	Neurokirurgi	Oftalmologi			
Ortopædikirurgi	Plastikkirurgi	Tand-, mund- og kæbekirurgi	Thoraxkirurgi	Urologi			
Øre-, næse- og halskirurgi							
Tværgående specialer							
Anæstesiologi	Diagnostisk radiologi	Klinisk iskæmi	Klinisk farmakologi	Klinisk genetik			
Klinisk immunologi	Klinisk mikrobiologi	Klinisk patologi	Nuklearmedicin				
Andre tværgående og særlige specialer/centre							
Alut modtagelse	Pædiologi	Intensiv behandling	Rehabilitering	Universitetscenter i sørlig			
Præhospitalet	Opfølgning	Demensdiagnostik	Syggehusmedicin, Årre				
Støttefunktioner							
Serviceafdelinger	Administration	Hygiejne	Børnehjælp	Hjerteslag	Brand		
Patientforløb	Syggehuspraktik Fyn	Egenkontrol	Hjælp til indlæser				







2) Overekstremitet: Albue, underarm, hånd


Undersøgelse	Indikation	Projektion
UXRF25 Albue (articulatio cubiti)	Alt Hvis albuen ikke kan strækkes	1. AP 2. LAT Alternativ AP: Projektioner med Antebrachium på pladen og Humerus på pladen Supplement til traume: Ved negativ fund: 3. AP skrå til begge sider ved pt > 10 år. Hvis ikke skrå opt. så: 4. Albue 45°
UXRF30 Antebrachium	Alt	1. AP 2. Antebrachium LAT
UXRF40 Håndled (articulatio radiocarpea)	Alt	1. PA 2. LAT
UXRF40 Håndled Stress-optagelser	Special lægelig indikation	1. PA neutral 2. PA max. Ulnadeviation 3. PA max. Radial deviation 4. LAT neutral 5. LAT max. volar fleksion 6. LAT max. dorsal extension
UXRF45 Os scapuloideum	Obs. Fraktur	1. PA af håndled 2. LAT af håndled 3. Scapuloideum - specialoptagelser
UXRF45 Carpalhumer	Efterfølgende kontrol Sociallæge indikation	Scapuloideum - specialoptagelser Carpalhumer



OUH, Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus

Kvalitetsorganisation	Tværgående dokumenter	Patientforløb	Handlplaner
Interne medicinske specialer			
Endokrinologi	Gastroenterol. og hepatol.	Geriatrici	Neurologi
Kardiologi	Lungemedicin	Nefrologi	Reumatologi
Øvrige medicinske specialer			
Arbejds- og miljømedicin	Dermato-venereologi	Neurologi	Onkologi
Kirurgiske specialer			
Cytopneumologi og thoraxkirurgi	Karlkirurgi	Kirurgi	Neurokirurgi
Ortopædkirurgi	Plastikkirurgi	Tand-, mund- og kæbekirurgi	Thoraxkirurgi
Øre-, næse- og halskirurgi			
Tværgående specialer			
Anæstesiologi	Diagnostisk radiologi	Klinisk toksikologi	Klinisk farmakologi
Klinisk immunologi	Klinisk mikrobiologi	Klinisk patologi	Nuklearmedicin
Andre tværgående og særlige specialer/centre			
Akut modtagelse	Audiologi	Intensiv behandling	Rehabilitering
Præhospitalet	Opfølgning	Demensdiagnostik	Sygehusmedicin, Ære
Støttefunktioner			
Serviceafdelinger	Administration	Hjælpesystemer	Beredskab
Patienthistorik	Sygehuspraktik Fys.	Egenkontrol	Hjælp til Indlæser

Knoglebogen









Skelet



< Skelet




Hånd



< Projektioner



PA



Lejring:

Siddende med aktuelle side mod lejet.
Albuen flekteres 90° og lejet hæves til
skulderhøjde. Håndleddet i neutralstilling
med håndfladen mod pladen.

Rørkipning:

0°.

Centrering:

I håndleddet midt mellem processus
styloideus radii og ulnae.

Kriterier:

Antebrachium og 3.metacarp (aksen) skal
ligge på en lige linje.

Tak



christian.tvede@rsyd.dk
Innovationskonsulent

